

# 中山大学

## 2019年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 308

科目名称: 护理综合

考试时间: 2018年12月23日上午

考生须知  
全部答案一律写在答题纸上, 答在试题纸上的不计分! 答题要写清题号, 不必抄题。

一、单项选择题(下列的每道题有A、B、C、D、E五个备选答案, 请从中选择一个最合适的答案, 写在答题纸上。共140分, 每题2分, 共70题)

答题引导: 请严格按照以下格式答题:(10小题一行): 1.X 2.X ..... 10.X 另起一行答题。

1. 在临床工作中, 最常见的医院感染传播途径是

- A. 医务人员的手    B. 器械传播    C. 空气传播    D. 飞沫传播    E. 接触传播

(以下病例为2~3题共用)

患儿男, 3岁, 腹痛3小时入院, 经检查后诊断为: 胃肠痉挛。

2. 以下适宜该患儿的治疗是

- A. 湿热敷    B. 热水袋外敷    C. 冰袋外敷    D. 烤灯照射    E. 冷湿敷

3. 使用该治疗方法时, 温度应为

- A. 0°C    B. 10°C    C. 30°C    D. 50°C    E. 60°C

4. 临床上用乙醇作为消毒剂浓度不能超过80%的主要原因是

- A. 乙醇杀菌需要一定量的水分    B. 可减轻对人体呼吸道的刺激  
C. 增加其化学稳定性    D. 避免过敏    E. 减少挥发

5. 患者男, 30岁, 入院诊断急性非淋巴细胞白血病, 口腔评估见其左侧颊粘膜有3mm×3mm溃烂。以下最适合该患者的口腔护理液是

- A. 甲硝唑    B. 生理盐水    C. 过氧化氢    D. 碳酸氢钠    E. 硼酸溶液

6. 给患者留置导尿管前, 需要彻底清洁外阴的目的是

- A. 防止污染导尿管    B. 使患者舒适    C. 便于固定导尿管  
D. 清洁并减少会阴部病原微生物    E. 防止污染导尿的无菌物品

7. 给尿潴留患者首次导尿时, 放出的尿量不应超过

- A. 300ml    B. 500ml    C. 1000ml    D. 1500ml    E. 2000ml

(以下病例为8~9题共用)

患者, 男, 76岁, 糖尿病。护士拟用Norton压疮风险评估表对患者的皮肤情况进行评估。

8. 该评估表的内容不包括

- A. 精神状态    B. 营养状况    C. 灵活程度    D. 活动能力    E. 失禁情况

考试完毕, 试题随答题纸一起交回。

第1页 共9页

9. 当评估得分是以下哪个数值时, 患者容易发生压疮

- A.  $\leq 12$       B.  $\leq 14$       C.  $\leq 16$       D.  $\leq 18$       E.  $\leq 20$

10. 在为患者吸痰的操作中, 以下手法不正确的是

- A. 接电源、接管道、试机      B. 零负压插管至需要吸痰处      C. 左右旋转、边吸边退管并观察  
D. 先冲管, 然后关机, 最后撤管      E. 每次吸引时间起码 15 秒以上

(以下病例为 11~12 题共用)

护理查房时, 患者: “昨天半夜我觉得肚子闷闷痛, 胀胀的, 难受得睡不着觉……”, 护士: “你刚才说你半夜感到肚子痛和胀胀的, 是吗?” 患者: “是的……”。

11. 该护士使用的沟通方法是

- A. 改述      B. 重述      C. 澄清      D. 提问      E. 归纳

12. 该护士与患者的对话属于哪一层次的沟通?

- A. 一般性交谈      B. 共鸣性交谈      C. 情感性交谈      D. 治疗性交谈      E. 分享性交谈

(以下病例为 13~15 题共用)

患者, 男, 35 岁, 车祸致脑外伤术后。患者生命体征基本稳定, 心肺肾功能正常。术后医嘱之一: 20%甘露醇 250ml iv drip。请问:

13. 现在输液管的点滴系数是 15, 则该患者输入上述溶液的速度应为

- A. 150 滴/分钟      B. 100 滴/分钟      C. 80-100 滴/分钟  
D. 50-80 滴/分钟      E. 30-50 滴/分钟

14. 目前上述溶液输入速度的最主要依据是患者的

- A. 年龄, 生命体征      B. 病情, 药物性质      C. 心、肺、肾功能  
D. 年龄, 药物性质      E. 病情, 心、肺、肾功能

15. 上述输液如果通过加压输入, 应特别注意观察以下哪种情况的发生

- A. 发热反应      B. 过敏反应      C. 空气栓塞      D. 溶血反应      E. 静脉炎

16. 关于针刺伤的伤口处理, 不正确的是

- A. 由远心端至近心端地挤出血液      B. 先肥皂水清洁再流水下反复冲洗  
C. 生理盐水反复冲洗      D. 75%酒精或碘伏消毒      E. 最后用消毒敷料包扎

17. 关于化疗废弃物和污染物的处理, 正确的是

- A. 一次性衣帽: 直接投入医疗垃圾箱      B. 床上用物: 直接送医院洗涤间洗涤  
C. 洗手池、马桶: 用清洁剂、热水清洗      D. 患者使用的一般用物: 热水冲洗 1 次  
E. 化疗 48 小时内的患者体液: 戴手套、穿隔离衣处理

18. 在病情观察中, 应注意的“患病时变化最敏感的指征”是

- A. 生命体征      B. 自理能力      C. 瞳孔      D. 意识      E. 表情

19. 对于幽门梗阻的患者, 为减轻胃粘膜水肿而实施洗胃的最佳时间为

A. 餐前 0.5~1h    B. 餐前 1~2h    C. 餐后 4~6h    D. 餐后 1~2h    E. 餐后 2~3h

20. 以下哪一项是对临终关怀和姑息照护的正确描述

- A. 临终关怀更强调优生                      B. 临终关怀更关注家属心理照护  
C. 姑息照护更强调优死                      D. 姑息照护强调优死的同时更强调优活  
E. 临终关怀和姑息照护的宗旨强调全家和全程照顾

21. 患者男, 31 岁, 因醉酒后第二天开始出现咳嗽、畏寒伴有高热, 最高体温达 39°C。社区诊所治疗 3 天后高热症状未见好转, 并开始咳大量脓痰。到医院查胸片提示“右肺部炎症、急性肺脓肿”。关于该患者的护理, 下列说法错误的是

- A. 鼓励患者进行有效咳嗽                      B. 加强口腔护理                      C. 观察和记录痰液的颜色和性状  
D. 尽快予以体位引流排出脓痰                      E. 告知患者积极配合 2~3 个月的长期治疗

22. 以下不属于继发型肺结核的是

- A. 浸润型肺结核                      B. 空洞型肺结核                      C. 血行播散型肺结核  
D. 干酪样肺炎                      E. 纤维空洞型肺结核

23. 患者女, 36 岁, 因反复咳脓痰 5 年、加重伴发热 2 天入院。诊断为“支气管扩张症”。患者每日咳痰量约为 200ml。近两天患者咳痰量突然减少, 体温最高 39.5°C。作为主管护士, 首先要加强下列哪项护理措施

- A. 遵医嘱正确使用抗生素    B. 口腔护理    C. 高热护理    D. 体位引流    E. 体液管理

24. 患者女, 56 岁, COPD 病史 8 年。近日来, 患者出现气促明显, 咳嗽、咳白色泡沫痰, 患者腹胀明显, 恶心, 食欲差。体查发现颈静脉怒张, 双下肢无水肿。患者目前的治疗重点是

- A. 抗感染                      B. 使用正性肌力药物                      C. 使用负性肌力药物  
D. 氧疗                      E. 使用血管扩张药

25. 关于气管切开接呼吸机通气患者的气道管理措施不正确的是

- A. 加温湿化罐内只能加无菌生理盐水                      B. 每次吸痰前后需要给予高浓度吸氧  
C. 每次吸痰时间不超过 15s                      D. 每天更换气管切开敷料  
E. 及时倾倒呼吸机管道的积水

26. 右心衰病人出现食欲不振、恶心、呕吐、腹痛等症状, 是由于

- A. 肺循环瘀血                      B. 胃肠道瘀血                      C. 肠系膜小动脉痉挛  
D. 迷走神经反射增强                      E. 交感神经反射增强

27. 护士在为慢性心力衰竭患者给予地高辛 0.25mg 口服前, 应首先评估患者的

- A. 体温                      B. 脉搏                      C. 呼吸                      D. 血压                      E. 体重

28. 对于无器质性心脏病的室性期前收缩的处理, 应采用

- A. 去除病因和诱因    B. 胺碘酮    C. 维拉帕米    D. 普罗帕酮    E. 美西律

29. 下列哪种情况下最容易发生脑栓塞

- A. 主动脉瓣狭窄合并心房颤动                      B. 原发性高血压合并心房颤动  
C. 二尖瓣狭窄合并心房颤动                      D. 心力衰竭合并心房颤动

E. 肺动脉瓣狭窄合并心房颤动

30. 患者男，66岁。有高血压病史8年，2年前曾有短暂性脑缺血发作。本次入院时血压165/105 mmHg，心功能Ⅲ级，心电图示左室肥大。该患者属于

- A. 高血压2级，中度危险      B. 高血压2级，高度危险  
C. 高血压3级，高度危险      D. 高血压3级，中度危险  
E. 高血压2级，极高危险

31. 急性渗出性心包炎患者最常见的症状是

- A. 心前区疼痛      B. 呼吸困难      C. 脉搏短绌      D. 发绀      E. 声音嘶哑

32. 自身免疫性胃炎患者易发生巨幼细胞贫血的主要原因是

- A. 内因子缺乏导致维生素 B<sub>12</sub> 的合成减少      B. 内因子缺乏导致维生素 B<sub>6</sub> 的吸收不良  
C. 内因子缺乏导致维生素 B<sub>12</sub> 的吸收不良      D. 内因子缺乏导致维生素 B<sub>6</sub> 的合成减少  
E. 内因子缺乏导致维生素 B<sub>1</sub> 的吸收不良

33. 患者住院期间进行了根除幽门螺杆菌的四联疗法，以下可采用的治疗方案是

- A. 埃索美拉唑 40mg + 克拉霉素 0.5g + 甲硝唑 0.4g + 阿莫西林 1.0g, qd  
B. 左氧氟沙星 0.5g + 克拉霉素 0.5g + 阿莫西林 1.0g + 果胶铋 0.3g, qd  
C. 埃索美拉唑 40mg + 克拉霉素 0.5g + 阿莫西林 1.0g + 果胶铋 0.3g, bid  
D. 果胶铋 0.3g + 克拉霉素 0.5g + 甲硝唑 0.8g + 阿莫西林 1.0g, bid  
E. 果胶铋 0.3g + 左氧氟沙星 0.5g + 阿莫西林 1.0g + 克拉霉素 0.5g, bid

34. 结核分枝杆菌侵犯肠道的主要途径是

- A. 经口感染      B. 接触传播      C. 飞沫传播      D. 呼吸道传播      E. 体液传播

35. 患者男，19岁，因“反复腹泻、便血2月余”就诊。结肠镜结果显示“溃疡性结肠炎”。针对该患者，以下饮食指导正确的是

- A. 低纤维、高蛋白、低热量饮食      B. 低纤维、高蛋白、高热量饮食  
C. 高蛋白、低脂肪、低热量饮食      D. 高纤维、高蛋白、高热量饮食  
E. 高纤维、高蛋白、低热量饮食

36. 筛查脂肪性肝病时最重要的辅助检查是

- A. 血脂检查      B. B超      C. CT      D. MRI      E. BMI

37. 患者男，59岁，既往有乙型肝炎病史。因“反复腹胀3个月，加重1周伴少尿”入院。诊断为“肝硬化失代偿期，腹水”。护士按医嘱测量腹围 qd，以下错误的是

- A. 每日定时测量腹围      B. 测量腹围前排尿  
C. 测量腹围时患者站立位，双腿分开与肩同宽，双臂自然下垂  
D. 用软尺在肚水平绕腹一周      E. 腹围以厘米记录

38. 引起急性肾炎水肿的主要机制是

- A. 全身毛细血管通透性增加      B. 肾小球滤过率下降      C. 大量蛋白尿导致低蛋白血症  
D. 抗利尿激素分泌过多      E. 血浆胶体渗透压下降

39. 下列哪种疾病不会出现管型尿

- A. 肾病综合征      B. 急性肾小球肾炎      C. 急进性肾小球肾炎  
D. 急性肾盂肾炎      E. 急性膀胱炎

40. 患者男，69岁。因尿频、尿急、尿痛、排尿滴沥不尽2天初步诊断为“良性前列腺增生，急性膀胱炎”入院。该患者发生急性膀胱的主要因素是

- A. 会阴部皮肤感染      B. 尿路梗阻      C. 体内残留慢性感染灶  
D. 饮水过少      E. 长期久坐

41. 尿毒症最早出现的症状是

- A. 心血管系统症状      B. 胃肠道症状      C. 血液系统症状  
D. 呼吸系统症状      E. 神经精神和肌肉系统症状

42. 护士对维持性血液透析患者进行健康教育时，下列内容正确的是

- A. 优质低蛋白饮食      B. 多食蘑菇、橘子等食物      C. 尽可能多卧床休息  
D. 每日饮水量为透析脱水量      E. 每天定时测量体重

43. 关于溶血性贫血的骨髓象描述正确的是

- A. 骨髓增生低下      B. 粒细胞明显减少      C. 非造血细胞比例明显增多  
D. 可见大量中幼和晚幼红细胞      E. 三系细胞均有不同程度减少

44. 下列符合重型再障患者的骨髓象的描述是

- A. 细胞核发育晚于细胞质      B. 骨髓增生活跃      C. 红系增生为主  
D. 可见大量巨核细胞      E. 粒、红细胞均明显减少

45. 下列关于血友病的说法正确的是

- A. 皮下软组织及肌肉出血最为常见      B. 血友病A是缺乏凝血因子FIX  
C. 血友病B病情较重      D. 血友病为常染色体遗传性疾病  
E. 关节腔出血是导致病人死亡的主要原因

46. 非APL急性髓细胞性白血病的诱导缓解化疗方案常用

- A. DNR+Ara-C      B. DNR+VCR+L-ASP+P      C. ATRA  
D. HD MTX      E. HD Ara-C

47. 患者女，40岁，因“纳差、乏力、毛发脱落1年，胸闷1月”就诊。实验室检查结果示TSH升高，T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>降低。下列针对该患者的护理措施中错误的是

- A. 定时复查甲状腺功能，根据检查结果按医嘱调整药量  
B. 高蛋白、高维生素、低钠、低脂肪饮食  
C. 指导病人避免进食含碘丰富的海带、紫菜等食物  
D. 适当锻炼，注意防寒保暖，避免感冒  
E. 指导患者多食用新鲜蔬菜，养成规律排便的习惯

48. 患者女，28岁，因“肥胖、月经不规则1年”就诊。CT结果示垂体肿物。诊断为Cushing综合征。针对该患者的饮食护理错误的是

A. 低钠            B. 低钾            C. 低碳水化合物            D. 高蛋白            E. 高钙

49. 患者女, 51岁。因“多饮、多食、消瘦6个月, 双足烫伤2周”就诊。入院后完善各项检查, 经医生诊断为“2型糖尿病, 糖尿病足”。以下护士对患者进行的糖尿病足健康教育不正确的是

- A. 趾甲要平着横剪, 不可修圆            B. 每晚睡前用镜子查看脚底            C. 不可用暖水袋保暖  
D. 最好穿拖鞋            E. 洗脚时避免用毛刷擦脚

50. 住院患者王某, 女, 19岁, 诊断为“系统性红斑狼疮”。按医嘱给予强的松 60mg qd。以下用药指导正确的是

- A. 空腹服药            B. 晨起一次性服用            C. 如出现恶心、呕吐, 可减少一半药量  
D. 如有不适, 可分次服用            E. 若行腹部CT, 可暂停服用

51. 破伤风时注射大量TAT的目的是

- A. 控制和解除痉挛            B. 抑制破伤风杆菌的生长            C. 减少毒素的产生  
D. 中和游离毒素            E. 中和游离与结合的毒素

52. 某失血性休克患者, 经输血2500ml后, 血压80/50mmHg (10.64/6.65kPa), 尿量30ml/h, 中心静脉压15cmH<sub>2</sub>O, 提示

- A. 血容量不足            B. 心功能不全            C. 周围血管扩张  
D. 静脉过度收缩            E. 肾功能不全

53. 患者男, 50岁, 术后7天后, 突然咳嗽时自觉腹部切口剧痛, 伤口全层离开, 小肠脱出, 正确的处理是

- A. 立即还纳腹腔, 蝶形胶布拉拢伤口            B. 立即还纳腹腔、加压包扎  
C. 立即还纳腹腔, 准备缝合  
D. 不在病床上还纳, 用无菌盐水纱布覆盖、腹带包扎, 送手术室处理  
E. 无菌纱布包裹后送回腹腔

54. 患者男, 择期手术后第四天, 患者切口周围疼痛, 体温38.5°C, 最可能的原因是

- A. 手术切口感染            B. 外科手术热            C. 肺部感染  
D. 尿路感染            E. 肠粘连

55. 患者女, 40岁, 近2个月间断出现左侧乳头溢血性液, 挤捏乳头时血性溢液增多, 无痛, 乳房内未扪及肿块。首先考虑的疾病是

- A. 乳房纤维腺瘤            B. 乳腺囊性增生病            C. 乳管内乳头状瘤  
D. 乳癌            E. 急性乳房炎

56. 患者男, 38岁, 4h前负重物时, 右侧腹股沟斜疝被嵌顿, 下列哪项表现说明疝内容物已发生缺血坏死

- A. 疝块增大, 不能回纳            B. 疝块紧张发硬            C. 疝块有压痛  
D. 阵发性腹痛伴呕吐            E. 全腹有压痛、腹肌紧张

57. 患者男, 50岁, 气胸术后行胸腔闭式引流。该患者需过床, 护士应采取的最重要的措施是

- A. 保证引流管通畅            B. 引流瓶不能高于病人的胸腔平面

C. 避免引流管受压、扭曲      D. 注意管内水柱波动情况      E. 双钳夹闭引流管，暂停引流

58. 患者女，50岁，因直肠癌行结肠造口术。术后2~3天肠功能恢复后，患者一般宜取的体位是  
A. 造口侧的侧卧位      B. 非造口侧的侧卧位      C. 平卧位      D. 俯卧位      E. 中凹位

59. 食管癌的典型症状是

A. 进行性消瘦      B. 进行性吞咽困难      C. 进行性呕吐  
D. 间歇性胸痛      E. 进行性胸痛

60. 患者男，39岁，B超和CT检查发现右肝3cm\*5cm占位性病变，性质不明，AFP阴性。哪项检查对明确诊断最有帮助

A. MRI      B. 肝动脉造影      C. 肝动脉造影+CT检查  
D. 动态观察AFP变化      E. 肝脏穿刺+病理学检查

61. 患者男，35岁，因胆石症胆管炎住院。血化验pH7.30，BE-7mmol/L，CO<sub>2</sub>CP15mmol/L，提示有

A. 代谢性酸中毒      B. 代谢性碱中毒      C. 呼吸性酸中毒  
D. 呼吸性碱中毒      E. 复合性碱中毒

62. 破伤风的症状表现，下列哪一项是正确的

A. 肌肉强直收缩始于咀嚼肌      B. 潜伏期越长，预后越差  
C. 一般体温均升高      D. 病人神智不清楚      E. 逼尿肌痉挛常致尿失禁

63. 女性，58岁，反复出现剑突下疼痛、寒战高热、黄疸，根据Charcot三联征的典型表现，应考虑的疾病是

A. 肝内胆管结石      B. 胆囊结石      C. 胆总管结石      D. 慢性胆囊炎      E. 慢性胰腺炎

64. 患者男，45岁，因工伤造成腹部开放性损伤，有肠管脱出，在急救现场的护士应

A. 立即向腹腔还纳      B. 等渗盐水冲洗后敷料包扎  
C. 清洁器皿覆盖后再包扎      D. 无菌纱布包裹后送回腹腔      E. 用无菌溶液冲洗后送回腹腔

65. 患者男，59岁，因胃癌行胃大部分切除手术后，患者一直抱怨胃肠减压管很难受，想拔除该管，护士应告诉患者出现哪项主要指征时可以停止胃肠减压？

A. 腹痛减轻      B. 腹胀减轻      C. 无恶心呕吐  
D. 胃肠减压3日以上      E. 肛门排气排便

66. 头皮损伤中最严重的是头皮

A. 血肿      B. 裂伤      C. 擦伤      D. 挫伤      E. 撕脱伤

67. 患者男，29岁，因转移性右下腹痛收入院，初步考虑为急性阑尾炎。查体时对确诊最有帮助的体征是

A. 右下腹固定压痛      B. 腹膜刺激征      C. 腰大肌实验阳性  
D. 右下腹包块      E. 结肠充气实验阳性

(68~70 题共用题干)

李先生, 35 岁, 骑自行车途中突发左腰部刀割样痛, 向下腹部和外阴部放射, 伴恶心、呕吐。体查: 肾区有叩击痛, 尿常规检查可见镜下血尿。疑有上尿路结石。

68. 首选的检查是

- A. CT                                  B. 平片                                  C. 排泄性尿路造影  
D. 逆行肾盂造影                                  E. 膀胱镜检查

69. 急诊处理时, 应首先

- A. 抗感染                                  B. 应用止吐药                                  C. 静脉输液                                  D. 解痉、止痛                                  E. 急诊手术

70. 预防本病最主要的方法是

- A. 大量饮水                                  B. 少吃肉类                                  C. 保持排便通畅                                  D. 多运动                                  E. 定期复查

二、简答题 (共 60 分, 每题 10 分, 共 6 题)

71. 请简述酒精拭浴前给患者头部置冰袋、足部置热水袋的作用。

72. 在 Orem 自理理论中如何解释“人”。

73. 简述长期家庭氧疗适用于什么病人, 护士对长期家庭氧疗病人的指导内容。

74. 简述缺铁性贫血病人注射铁剂治疗的主要不良反应及护理措施。

75. 如何做好门静脉高压症急性出血期的护理。

76. 如何保持胸腔闭式引流管道的封闭和无菌。

三、病例分析 (共 100 分, 每题 20 分, 共 5 题)

77. 患者女, 50 岁。自觉口渴、多饮、多尿、疲乏约 3 个月, 遂来医院就诊, 化验空腹血糖为 16mmol/L, 拟“2 型糖尿病”收入院。医嘱: RI 6u H tid 餐前 30min。请问:

- (1) 患者的胰岛素应如何保存?
- (2) 给患者注射时, 能否采用碘剂消毒皮肤? 为什么?
- (3) 给患者执行注射, 还有哪些注意事项?

78. 患者, 男性, 56 岁, 反复胸闷, 胸痛 5 年, 心前区痛 8 小时初步诊断为“冠心病, 急性心肌梗死”入院。查体: 血压 80/50mmHg, 脉搏 80 次/分, 呼吸 20 次/分, 双肺可闻及少许湿罗音, 心律不齐, 心室率 104 次/分, 未闻及杂音, 半卧位, 心电图示房颤心律, I、aVL、V1-V4 ST 段抬高 0.3mV。请问:

- (1) 哪些实验室及辅助检查结果对患者的诊断最为重要?
- (2) 患者目前有哪些潜在并发症, 针对性护理措施有哪些?



79. 患者乐某, 女, 49 岁。因“上腹部剧烈疼痛伴呕吐 1 天”由急诊收入院。患者于 1 天前进食油腻饮食后出现上腹部疼痛, 呈持续性绞痛, 放射至腰背部, 伴有呕吐, 呕吐为胃内容物。

入院后体查示: 体温 38.2°C, 脉搏 110 次/分钟, 呼吸 36 次/分钟, 血压 98/60mmHg。神志清, 急性面容, 屈膝卧位。腹部稍膨隆, 腹壁紧张, 全腹压痛, 无明显反跳痛, 未见肠型及腹部包块, 肝脾未触及, 无叩击痛, 移动性浊音 (-), 肠鸣音减弱。

实验室检查结果示: 白细胞  $15.7 \times 10^9/L$ , 中性粒细胞 91.2%, 血淀粉酶 627U/L。

CT 结果示: 胰腺体积增大, 周围可见液性低密度影包绕, 与周围组织脂肪间隙分解不清。

请问:

(1) 患者可能的临床诊断是什么?

(2) 请依据所给资料按优先原则提出 2 个护理诊断 (包含合作性问题, 护理诊断用 P: E 格式), 并列出的护理措施。

80. 刘先生, 72 岁。诉经常有夜尿、排尿费力和尿湿裤子。经追问病史, 病人近 1 年来还有排尿迟缓、尿线变细现象。之前从没有发生过急性尿潴留。

查体: 前列腺鸽子蛋大小; 前列腺 B 超示: 前列腺 5.1cm×4.4cm×4.0cm, 残余尿量 105.8ml; 尿流动力学检查: 最大尿流率为 9.3ml/s。请问:

(1) 建议何种治疗为宜? 为什么?

(2) 相应的护理措施?

81. 患者男, 43 岁。18 个月前无明显诱因出现不规则性上腹疼痛, 伴反酸、嗝气, 服抗酸药无明显好转; 近 6 个月食欲明显减退, 体重下降 4kg。经胃镜检查确诊为胃癌, 拟手术治疗收治入院。

请问:

(1) 患者入院后行胃大部分切除术, 术后应放置什么引流管来减轻胃肠道的压力? 该管道的护理要点。

(2) 术后第 2 周, 病人进食 10~20 分钟后出现上腹饱胀、头晕、心悸、出冷汗、恶心呕吐。考虑可能发生了什么问题? 应如何预防和处理?